MAP OF MARS | A MARS TÉRKÉPE | MAPA MARSU
KARTA MARSA | MAPA MARSA

Central European Edition. Lambert Transversal Equivalent Azimuthal Projection **1:25 000 000**
Shade relief base map: Cartographers: L. S. Oreshina, L. Yu. Baeva. Editors: B. V. Krasnopevtseva, K. B. Shingareva, Moscow State University for Geodesy and Cartography (MIIGAiK). This map was made in the frame of the cooperation between the Cosmic Materials Space Research Group of Eötvös Loránd University, Budapest (Henrik Hargitai, editor, map layout), and the Moscow State University for Geodesy and Cartography (MIIGAiK) (B. V. Krasnopevtseva, K. B. Shingareva), Moscow Sternberg Astronomical Institute (Vsevolod Shevchenko), Observatory and Planetarium Prague (Antonín Rükl, Czech translation), Zagreb Astronomical Observatory (Dragan Roša, Croatian translation), Jagiellonian University Observatory, Krakow (Tomasz Kundera, Polish translation), the Department of Geology of Lorand Eötvös University, Budapest (Tivadar Marjanac), and the Tectonics and Geological Cartography Section, Faculty of Geology, Warsaw University (Wojciech Ozimkowski); under support of ICA Commission on Planetary Cartography.

Lambertovo ekvivalentní azimutální zobrazení **1:25 000 000**
Nákresová území na mapě: L.S. Oreshina, L.Yu.Baeva, B.V.Krasnopevtseva, K.B. Shingareva; Moscow State University for Geodesy and Cartography (MIIGAiK), Tvar Marsu byl nahrazen kouli o průměru R=3393,4 km. Geometrická konstrukce byla provedena v jemném měřítku. Mapa (reliéf pokrasen izofiniami) 1:20 000 000 (kontury MIIGAiK, 1982). Další karty tematického atlasu *Shaded Relief Map of Eastern, Western, and Polar regions of Mars*, 1: 15 000 000 (1985), publikace Mars, 1: 15 000 000 (1985) i izdanija Mars autora H. Wolf, Goths 1984. Použité názvy útvarů byly upraveným a doplněným vydáním (nadstavba kartuše) se zařazením *Planetary Nomenclature Database*. Podací soustavy *Gazetteer of Planetary Nomenclature*. Wartości danych wysokościowych pochodzą z cyfrowej mapy Marsa (NASA/MOLA Team) na digitalnej mapie Marsa (NASA/MOLA Team) Barwy wyjściowe geologiczne/morfologiczne na mapie *Geologic-morphological map of Mars* (NASA/MOLA Team). Odabir boja geološkoh podzjenja temelji se na *Geologic-morphological map of Mars* 1: 50 000 000 i Atlas planet zemnoy grupi i ih sputnikov (MIIGAiK, Moskva, 1992).

Lambert-féle azimutális területtartó síkvetület **1:25 000 000**
Domborzatmodellezéshez szükség: L. S. Oreshina, L. Yu. Baeva, B. V. Krasnopevtseva, K. B. Shingareva, Moszkvai Állami Geodéziai és Térképészeti Egyetem (MIIGAiK). *Földtani alap:* 3393,4 km sugarú gömbfelületen. *Geomorfológiai alap:* Mars szintvonalas térképe 1: 20 000 000 (MIIGAiK, 1982). *Az izolíniák tartalom alapján:* A Mars keleti, nyugati és sarki vidékeinek domborzatmodellezéshez térképe 1: 15 000 000, 1:30 000 000, H. Wolf: Mars (Gotha 1984). Az eredeti térképi tartalmon a Gazetteer of Planetary Nomenclature alapján lett korrigálva. Az összeállítás a Geographic Information Systems (NASA/MOLA Team) digitális magassági térképe értékei alapján vannak feldolgozva. *A geológiai egységek* a Mars geológiai-morfológiai térképe (1: 50 000 000, in: Atlasz planet zemnoj gruppi i ih sputnyikov, MIIGAiK, Moszkva, 1992) alapján készültek. A *Vörös Bolygó* kiás nevei magyar változata az ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Részének Csoport Planetológiai Kérdéses (Nincs Kiegyezés, Hargitai Henrik [szöveg], Konsztant Ákos [szakértő], Sik András) készült, 2001. Oszlo.

AZ ADATOK FORRÁSAI | ZDROJE ÚDAJŮ | IZVORI PODATAKA | ZRÓDŁA DANYCH:

- *Map of Mars.* Institute for Cartography, Dresden University of Technology, Germany. Map editor: M. F. Buchroithner. Cartographers: R. Franke, R. Pässler, R. Stanke, M. Tusche, U. Heidig. Map consultants: B. V. Krasnopevtseva, K. B. Shingareva; Moscow State University for Geodesy and Cartography (MIIGAiK), Moscow, 1992.
- *Topography of Mars* (MOLA Science Team, NASA)
- Michael E. Bakich: *The Cambridge Planetary Handbook.* Cambridge University Press, 2000.

Sikeres Mars-szondák | Úspěšné sondy k Marsu | Uspješne misije na Mars | Udane misje marsjańskie:

1965: Mariner 4 (USA)
1969: Mariner 6 (USA)
1969: Mariner 7 (USA)
1971: Mariner 9 (USA)
1974: Mars 4, 5 (USSR)
1976: Viking 1 / Viking 2 (USA)
1988: Phobos 2 (USSR)
1997: Pathfinder / Mars Global Surveyor (USA)
2001: Mars Odyssey (USA)

A VÖRÖS BOLYGÓ

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:
Természetföldrajzi jellemzők északról dél felé:
Északi-sarki sapka: CO_2-jég és por egymásra települt rétegei. 500 km átmérőjű.
A CO_2 -ből tavaszsal vékonyodó, majd a legközelebbi, maró összetételű kicsapódik a felszínre.
Homokdűnemezők között folyamatos gyűrűje veszi körül.
Északi mélyfélték: Kiterjedt lávamező borítja, rajta üledékes takaróval. Alig kráterezett síkságok.
Tharsis és Elysium Montes: Nagy forróföltpajzs- / tűzhányók vulkáni hátságon. *Olympus Mons:* 25 km magas a környező síkság fölött; átmérője 500 km, kalderáterülete 65 x 80 km.
Valles Marineris: Tektonikus eredetű, 4000 km hosszú kanyonrendszer, kiömlési csatornákkal.
Déli felföldek: Erősen kráterezett, ősi területek, két régi becsapódásos medencével: Hellas (2000 km átm.), Argyre (1100 km átm.). Hálózatos völgyek.
Déli-sarki sapka: Vízjég, CO_2-jég és por. Itt az (afélium) tél hidegebb és hosszabb, a (perihélium) nyár rövidebb és melegebb, mint északon. Tobzódik, mint az északi sapkában. A CO_2 nyáron sem tűnik el teljesen, de a télen még 1800 km átm. jeges terület nyárra lecsökken egy állandó, 150 km-es magra. A sarki területeken dűnemezők találhatók, melyeken évszakonként sötét kéreg foltok tűnnek fel.

KIS SZÉRKEZETEK:
Kráterek: Az 5 km-nél nagyobb krátereknek lebernyeges, fluidizált törmeléktakarója van: hirtelen megolvadt talajjég regolittal (talaj) és közettel keverve.
Lejtők: Párhuzamos üledékréteg kibukkanások): Kráterek belsejében, a kráterek közti területen, kanosztertelében, a chasmák belsejében, Hellyszínek: Arabia Terra, Northellas, Southern Elysium, Valles Marineris.

GEOLÓGIAI TÖRTÉNET:
Z. mállárd ős - mai időszakig (*Amazonian*) (A szél kora): az Olympus Mons feltalaján lávafolyásai (100-1000 millió évs), Elysium Mons, sarki sapkák. Eolikus folyamatok: szélerózió, dűnék, üledékek. Éghajlat: hasonló, száraz, ciklikus változásokkal.

2.7.-3.5 milliárd éve: *Hesztperiai* (A jég kora): Valles Marineris (lehetséges rift) és kiömlési völgyei, kiaszterfelület, Elysium Mons, Tharsishátság. Nocitis Labyrinthus. Éghajlat: hideg, száraz, ciklikus változásokkal.

3.5.-4.6 milliárd éve: *Noachiai* (A víz kora): Ennyi idősek a déli felföldek, az Argyrét és a Hellast is beleértve. Intenzív becsapódások. Éghajlat: meleg, a mainál sűrűbb légkör, folyékony víz. Hálózatos völgyek. Ocean Boreatis (?) Kráterlavak.

FÖLDRAJZI (AREOGRÁFIAI) ADATOK:
Teljes terület: 144 200 000 km^2
Referenciaszint: Háromtengelyű ellipszoid.
0 m magassága: A MOLA (*Mars Orbiter Laser Altimeter 1998-99*) térképeken: a 3396 km sugarú areoid jelöli ki. Ez kb. 1,6 km-rel magasabb, mint más térképeken (USGS, etc), ahol a 0 m szint a 6,1 mbar légnyomás (a víz háromspontja) szintjében van.
0 mbar (hosszúság): Airy-0 kráter.
Északi jégsapka hosszúsága: 1,2-1,7 km
Déli jégsapka térfogata: 2-3 km^3

LEGMÉLYEBB, LEGLAPOSABB, LEGMAGASABB CSÚCSNYABB… *(Zárójelben: magasság km-ben. Forrás: IAU)*
Domborzati különbség (relief): 29,5 km
Legmagasabb pontok: *Nyugati félteke:* Olympus Mons (21,3), Pavonis Mons (4), Arsia Mons (9), Ascraeus Mons (~20), Alba Patera (7), *Keleti félteke:* Olympus Mons vulkán (14)
Északi-sarki terület: ~1 km
Déli sarki terület: 4,8 km
Ismételyek pontok: Hellas-medence (-8,2), Valles Marineris (-7)

LEGNAGYOBB, LEGHOSSZABB…
(Zárójelben: átmérő/hosszúság km-ben. Forrás: IAU)
Legkisszabb völgyek (Vallis): Valles Marineris (3769), Kasei (1780), Ares (1690), Maja (1516), Marte (1185), Simud (1074), Tiu (970), Reull (945), Mamers (945), Ma'adim Vallis (861), Mangala (828), Dao (816), Granicus (750), Hrad (719), Shalbatana (687), Loire (670), Liris (613), Mawrth (575), Al-Qahira (546), Mad (524), Nanedi (508), Nirgal (496).
Legnagyobb kráterek: Schiaparelli (471 km), Huygens (470), Cassini (412), Antoniadi (394).
Legnagyobb hegyek (Montes): Tharsis (1840), Nereidium (1677), Phlegra (1310), Libya (1170 km), Hellespontus (729), Tartarus (830).
Legnagyobb völgyek (Valles): Olympus Mons (648), Arsia Mons (475), Ascraeus Mons (460), Elysium Mons (410), Pavonis Mons (375), Hecates Tholus (183), Albor Tholus (170)
Legkisszabb árkok (Fossae): Alba (2077), Claritas (2050), Icaria (2280), Sirenum (2735)

SZÉRKEZETEK ELNEVEZÉSE:
Albedo feature: felvirágzó-képesség alapján elülönülő terület
Catena, catenae: kráterlánc
Caves, cavi: kráterekből álló csoportosan előforduló, szabálytalan alakú, meredek falú mélyedések
Chaos: szabálytalan domborzatú, erősen lepusztult terület, káosz
Chasma, chasmata: hosszan kiterjedő, meredek falú, mély völgy, kanyon
Colles: kis domb, huppanó
Crater: kráter, kerek mélyedés
Dorsum, dorsa: (hegy)gerinc
Fossa, fossae: árok: hosszú, keskeny, sekély mélyedés
Labes, labes: hegycsuszamlás
Labyrinthus, labyrinthi: egymást keresztező, keskeny mélyedések, völgyek rendszere
Mensa, mensae: táblahegy, -hegyek, tág, lefelé és mindenfelé, éles peremmel körülhatárolt kiemelkedés
Mons, montes: hegy, vulkán
Patera, paterae: ászkély kráter: szabálytalan vagy összetett szerkezetű, hullámos falú-peremű, sekély kráter, vulkán
Planitia, planitiae: síkföld, medence
Planum, plana: felföld, fennsík
Rupes: szakadék
Scopulus: partfal: kanyargós peremű, meredek falú lesz akadás
Sulcus, sulci: barázda: párhuzamos barázdák, kiemelkedések (gerincek) és mélyedések
Terra, terrae: kiterjedt, ősi, szárazföld
Tholus, tholi: kúp, különálló domb, kisebb hegy
Undae: dűnék
Vallis, valles: völgy
Vastitas, vastitates: kiterjedt síkság

A Mars különféle nyelvének nyelvének: *arab:* Merrikh, *görög:* Ares, *héber:* Maja, *japán:* Kasei.

A Mars többnyelvű térképe az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport Planetológiai Kőre és a Moszkvai Állami Geodéziai és Térképészeti Egyetem (MIIGAiK) közötti együttműködés keretében készült.
Eredeti ötlet: K. B. Singareva.

Látogassa meg honlapunkat az interneten: http://planetologia.elte.hu. *Címünk:* ELTE TTK

ČERVENÁ PLANETA

CELKOVÝ POPIS
Fyzicky zeměpisné a geologické charakteristiky povrchu od severu k jihu:
Severní polární čepička: vrstvy ledu CO_2, vodního ledu a navátého prachu, průměr 500 km. Led CO_2 za jaře sublimuje do atmosféry a na podzim namrzá zpátky na povrch. Čepičku obklopuje téměř souvislý pás písečných dun.
Severní nížiny: pokrývají je rozsáhlé utuhlé lávové proudy a vrstvy usazenin; útvary vzniklé působením mrazu.
Pohoří Tharsis a Elysium: mohutné štítové sopky (vzniklé nad „horkými místy" v plášti Marsu) na vulkanické náhorní plošině. *Olympus Mons* výška 25 km nad okolními planinami, průměr základny 600 km, kaldera ve vrcholu 65 × 80 km.
Valles Marineris: 4000 km dlouhá soustava kaňonů tektonického původu; odtokový kortex.
Jižní vysočiny: starý povrch posetý četnými krátery, dále hluboké pánve: Hellas (průměr 2000 km) a Argyre (průměr 1100 km). Stíté údolí.
Jižní polární čepička: vrstvy vodního ledu, ledu CO_2 a prachu. Zima (v oblasti je zde chladnější a delší, a léto (v přísluní) je teplejší a kratší než odpovídající období na severu. Je zde vyšší pravděpodobnost výskytu ledu CO_2. Vrstva ledu CO_2 nemizí ani v létě, ale ledový povrch se zmenší ze zimního průměru 1800 km na stále menší(nejdál) kruh jádro o průměru 150 km. V polární oblasti jsou dunová pole a sezónní trhavé skvrny a dunami.

MALÉ ÚTVARY:
Kráter: kolem kráterů nad 5 km v průměru lalokovité uspořádaný vyvržený materiál, zřetelný valový okraj, téměř rovnovný podpovrchový led se sníženým obsahem prachu.
„Jezera" (zaneděná): po sobě vyčkyrý navážem rovnoběžných vrstev usazenin): uvnitř kráterů, v terénu mezi kráterv, v chaotickém terénu a uvnitř kaňonů.
Lokality: Arabia Terra, severní část Hellas, jižní část Elysium, Valles Marineris.

GEOLOGICKÁ OBDOBÍ:
Před 2,7 miliardami roků - podnes: *Amazonian.* Mělčí lávové proudy na Olympus Mons (100 - 1000 milionů let) a Elysium, polární čepičky, různé větru, větrná eroze, duny, prachové boule. Podnebí: chladné, suché s cyklickými změnami.Vék větru.

Před 2,7 - 3,5 miliardami roků: *Hesperian.* Valles Marineris (pravděpodobně tektonického původu) s odtokovými korzty, chaotické terény; Elysium Mons. Vydutí Tharsis. Nocitis Labyrinthus. Podnebí: chladné, suché s cyklickými změnami.Vék ledu.

Před 3,5 - 4,6 miliardami roků: *Noachian.* Stálí jižních vysočin. Vznik impaktních pánví Hellas a Argyre. Podnebí: teplá, hustá atmosféra, kapalná voda. Údolní sítě. Ocean Borealis (?) Kráterová jezera.Vék vody.

SOUČASNÉ DĚJE: Počasí: prachové víry, globální prachové bouře (kolem příslušní), větrné prahy, pohyb dun, vrstvy námrazy, sesuvy, malé rýhy. Sezónní cykly CO_2, H_2O, prachu.

MAGNETICKÉ POLE: "zbytková" pole v určitých oblastech

DRÁHOVÉ PARAMETRY
[Údaje pro Zemi v závorkách]
Sklon rovniku k rovině oběžné dráhy: 25,19° [23,45]
Sklon dráhy k rovině ekliptiky: 1,850° [0.00]
Excentricita dráhy: 0,0934 [0,0167]
Vzdálenost od Slunce: střední: 227.94*10^6 km= 1,523 AU [149.597*10^6 km=1,00 AU]
Odsluní (maximum):
249.25·10^6 km = 1,666 AU [1,016]
Přísluní (minimum):
206,61 ·10^6 km = 1,381 AU [0,983]
Vzdálenost od Země:
Maximum: 401,355·10^6 km = 2,68 AU.
Minimum: 54,51 ·10^6 km = 0,36 AU
Přáští konjunkce (nejbližé k Zemi): 10. 8. 2002, 15. 9. 2004, 24. 10. 2006, 6. 12. 2008
Přáští opozice (nejbližé k Zemi): 28. 8. 2003, 7. 11. 2005, 24. 12. 2007, 29. 1. 2010
Střední oběžná rychlost:
24,1 km/s [29,8 km/s]
Doba rotace (*1 den na Marsu = 1 „sol"):*
24 h 37m 22.66 s [23 h 56 m]
Oběžná doba (*1 rok na Marsu):* 686,98 d [365,2422]
Rychlost rotace (na rovniku): 866,9 km/h [1669,8 km/h]

Doba letu světla:
Země – Mars: 3 min 2 s- 22 min19 s
Slunce – Mars: 11 min 29 s -
13 min 51 s [8 min 11 s-8 min 27 s]

Měsíce: Phobos (průměr 27 km), Deimos (průměr 12 km)

ÚDAJE O MARSI
Rovníkový průměr: 3396 km [6378]
Polární průměr: 3379 km [6356]
Zploštění: 0,0059 [0,00335]
Obvod rovníku: 21326 km

Hmotnost:
6,418 ·10^{23} kg [5,976 x 10^{24} kg]
Hustota: 3,94 g / cm^3 [5,51 g / cm^3]

Objem: 16,43 ·10^{10} km^3 [10,87 ·10^{11} km^3]
Tíhové zrychlení: 3,72 m/s^2 = 0,38g [g=9,78 m/s^2]
Únková rychlost: 5,02 km/s = 18072 km/h [11,18 km/s]

Vizuální albedo: 0,16 [0,37]
Hvězdná velikost v opozici: max -2,9 mag, min -1,9 mag.
Úhlový průměr ze Země: max. 25,16 arcsec, min. 3,5 arcsec

Teplota povrchu (přibližná):
průměrná: -55 °C (Minimum: -170 °C, maximum: 20 °C)
Slunční konstanta:
595 W/m^2 [1380]
Úhlový průměr Slunce: 0,35° [0,53]
Albedo Slunce: -25,8 mag. [-26,7]
Atmosférický tlak:
6-9-9-912 Pa = 7 millibars (1 mb na hoře Olympus Mons, 9 mb v pánvi Hellas) [101325 Pa]
Rychlost větru: 2-30+ m/s
Složení atmosféry: 95% CO_2, 2,6% N_2, 1,6% Ar, 0,13 O_2, 0,07 CO, 0,03 H_2O

GEOGRAFICKÉ (AREOGRAFICKÉ) **ÚDAJE:**
Celkový povrch,planety:
144.200 000 km^2
Referenční hladina: třínový ellipsoid
Nulová výška: podle map MOLA (Mars Orbiter Laser Altimeter 1998-99): na poloměm 3396 km (areoid). Je o přibližně o 1,6 km výše než na jiných mapách (USGS, atd), kde je nulová výšky v úrovni atmosférického tlaku 6,1 mbar (= trojný bod vody).
Nulty poledník (nulová areografická délka): procházi kráterem Airy 0.
Objem severní polární čepičky:
1,2-1,7 km^3
Objem jižní polární čepičky: 2-3 km^3

NEJVYŠŠÍ, NEJNIŽŠÍ …
(V závorkách je výška v km. Zdroj: IAU)
Rozpětí výšek povrchových útvarů: 29,5 km
Nejvyšší body: *Západní polokoule:*
Olympus Mons (21,3), Pavonis Mons (4), Arsia Mons (9), Ascraeus Mons (~20), Alba Patera (7) *Východní polokoule:*
vulkán Elysium Mons (14)
Severní polární oblast: -1,9 km, *jižní oblast:* 4,8 km.
Nejnižší body: pánev Hellas (-8,2), Valles Marineris (- 7)

NEJVĚTŠÍ, NEJDELŠÍ …
(v závorkách: průměr/délka v km. Zdroj: IAU)
Nejdelší údolí (Vallis): Valles Marineris (3769), Kasei (1780), Ares (1690), Maja (1516), Marte (1185), Simud (1074), Tiu (970), Reull (945), Mamers (945), Ma'adim Vallis (861), Mangala (828), Dao (816), Granicus (750), Hrad (719), Shalbatana (687), Loire (670), Liris (613), Mawrth (575), Al-Qahira (546), Mad (524), Nanedi (508), Nirgal (496).
Největší kráter: Schiaparelli (471 km), Huygens (470), Cassini (412), Antoniadi (394).
Největší pohoří (Montes): Tharsis (1840), Nereidium (1677), Phlegra (1310), Libya (1170 km), Hellespontus (729), Tartarus (830).
Největší vulkány: Olympus Mons (648), Arsia Mons (475), Ascraeus Mons (460), Elysium Mons (410), Pavonis Mons (375), Hecates Tholus (183), Albor Tholus (170)
Nejdelší kaňony (Fossae): Alba (2077), Claritas (2050), Icaria (2280), Sirenum (2735)

NÁZVY ÚTVARŮ
Albedo feature: Albedový útvar
Catena, catenae: Kráterová řada
Caves, cavi: Nepravidelné prohlubně, sámy se strmými svahy, často ve skupinách
Chaos: Kolapsový terén s chaotickým povrchem
Chasma, chasmata: Kaňony, rokle se strmými stěnami
Colles: Malé pahorky či pahrbky
Crater: Kulovitá prohlubeň
Dorsum, dorsa: Horský hřbet
Fossa, fossae: Dlouhá, úzká mělká deprese, příkop
Labes, labes: Oblast se sesuvy
Labyrinthus, labyrinthi: Komplex protínajících se údolí
Mensa, mensae: Vyvýšenina s plochým vrcholem a strmými svahy, tabulová hora
Mons, montes: Hora, vulkán
Patera, paterae: Mělký, nepravidelný sopečný kráter, někdy se složitou strukturou okrajů
Planitia, planitiae: Nížina, plochá pánev
Planum, plana: Plošina, náhorní rovina
Rupes: Zlom
Scopulus: Zlom s lalokovitými či nepravidelnými obrysy
Sulcus, sulci: Soustředné brázdy a hřbety
Terra, terrae: Rozsáhlé pevninské oblasti
Tholus, tholi: Malé kupovité hory nebo kopce
Undae: Duny
Vallis, valles: Údolí
Vastitas, vastitates: Rozsáhlá planina

Mars v různých jazycích: *arabsky:* Merrikh, *řecky:* Ares, *hebrejsky:* Ma'adim, *japonsky:* Kasei. *Jiný název:* červená (rudá) planeta

Nabídka astronomických map v ČR:
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
HL.M. PRAHY
http://www.planetarium.cz
e-mail: planetarium@planetarium.cz

Zagreb Astronomical Observatory
Opatička 22. p.p. 943
10 001 Zagreb
Croatia
TEL.FAX.
++385 1 4851355
zvjezdarnica@zg.tel.hr

CRVENI PLANET

OPĆI OPIS:
Fizičke i geografske osobitosti od sjevernog pola prema južnom:
Sjevorna polarna kapa: Slojevi smrznutog CO_2 (suhog leda), vodenog leda i nalaga prašine promjera 500 km. Zamrznuti CO_2 sublimira u atmosferu tijekom proljeća, a ujesen se ponovno smrzava na površini. Okružena gotovo neprekinutim pojasom pješčanih dina.
Sjevorne nizine: raspostranjeni tokovi lave prekriveni sedimentnim naslagama na njima; periglacijalni procesi.
Tharsis i Elysium Montes: veliki štitasti vulkani na vulkanskim zaravnima.
Olympus Mons: visina: 25 km iznad okolnih ravnica; promjer: 600 km, dimenzije kaldere 65 × 80 km.
Valles Marineris: 4000 km duoluha sustava kanjona tektonskoga postanka; šatenasti kanali.
Južne visoravni: stara površina bogata kraterima s 2 udara depresije (bazena): Hellas (promjera 2000 km), Argyre (promjera 1100 km). Dolinska mreža.
Južna polarna kapa: slojevi leda, leda CO_2 i prašine. Tu je zima hladnija i dulja (Mars u afelu), dok je ljeto toplije i kraće (Mars u perihelu) negoli na sjevernoj polutki. Vrlo prašne nego na sjevernoj polarnoj kapi. Slojevi CO_2 održavaju se čak i tijekom ljeta, ali se promjer ledene površine smanjuje s 1800 km zimi na samo zegrpu promjera 150 km (ljeti). U polarnim područjima nalaze se pojle dina sa sezonskim pojavama tamnih kružnih mrlja.

MALI RELJEFNI OBLICI:
Krateri: Krateri promjera većeg od 5 km imaju zrakaste, fluidizirane izbačaje: nagło rastopljeni smrznuti sloj: materijal se pomiješa s ispljenim i raspršen (tlom) i stijenama.
„Jezera" (otkriveni slojevi sedimentnih stijena): unutrašnjosti kratera, područja među kraterima, neravan teren s ponorima. Lokacije: Arabia Terra, North-Hellas, Southern Elysium, Valles Marineris.

GEOLOŠKA POVIJEST:
Posljednjih 2,7 miljardi godina: *amazonsko razdoblje:* mladi vulkanski tokovi s vulkana Olympus Mons (100-1000 milijuna godina) i *Amazonian.* Mlađa lavove prodoja na Olympus Mons (100 - 1000 milionli let) a Elysium, polarni čepičky, različne větru, větrná eroze, duny, prachové boule. Podnebí: chladné, suché s cyklickými změnami.Vék větru.
Prije 2,7 - 3,5 miljardi godina: *hespersko razdoblje:* Valles Marineris (mogući rasjed) s drenažnim kanalima, neravan teren; Elysium Mons. Tharsis Bulge (izbočina). Labirint Noctis. Klima: hladna, suha s cikličkim promjenama. Doba leda.
Prije 3,5 - 4,6 miljardi godina: *noino razdoblje:* doba južnih visoravni. Argyre, zavala Hellas. Klima: topla, gusta atmosfera, tekuća voda. Dolinska mreža. Ocean Borealis (?) Kraterska jezera. Doba vode.

SADAŠNJI PROCESI: Vremenske prilike: pješčani vrtlozi, globalne pješčane oluje (za perihela), mlazne struje poznate dina, sloveći mraza, klizišta, mali kanali., Sezonski ciklus CO_2 H_2O i prašine.

MAGNETSKO POLJE: regionalna „zaostala" polja.

PARAMETRI ORBITE
[podaci za Zemlju u uglatim zagradama]
Prikon ekvatora premna ekliptici: 25,19° [23,45]
Nagib orbite prema ekliptici: 1,850° [0,00]
Numerički ekscentricitet: 0,0934 [0,0167]
Udaljenost od Sunca:
Srednja: 227,94·10^6 km
= 1,523 astronomskih jedinica (AJ)
[149.597·10^6 km =1,00 AJ]
Najveća (u afelu):
249,25·10^6 km = 1,666 AJ [1,016]
Najmanja (u perihelu):
206,61·10^6 km = 1,381 AJ [0,983]
Udaljenost od Zemlje:
Najveća 401,355·10^6 km = 2,68 AJ
Najmanja: 54,51·10^6 km = 0,36 AJ

Sljedeće konjunkcije (*Mars u najdaljem položaju od Zemlje*): 10. kolovoza 2002., 15. rujna 2004., 25. listopada 2006., 6. prosinca 2008. g.
Sljedeće opozicije (*Mars u položaju najbližem Zemlji*): 28. kolovoza 2003., 7. studenog 2005., 24. prosinca 2007., 29. siječnja 2010. g.
Srednja brzina revolucije:
24,13 km/s = 86 868 km/h [29,8 km/s]
Period vrtnje: 24 h 37 min 22,66 s [23 h 56 min]
Ophod oko Sunca (*dulina Marsove godine*): 686,98 dana [365,2422]
Obodna brzina rotacije (na ekvatoru): 866,9 km/h [1669,8]

Vrijeme dolaska svjetlosti
(najkraće, najdulje):
Od (do) Zemlje: 3 min 2 s, 22 min 19 s
Od (do) Sunca: 11 min 29 s, 13 min 51 s [8 min 11 s, 8 min 27 s]

Sateliti (mjesec): Fobos (promjer 27 km), Deimos (promjer 12 km)

FIZIČKI PARAMETRI
Polumjer / ekvatorski: 3396 km [6378]
Polumjer / polarni: 3379 km [6356]
Spljoštenost: 0,00519 [0,00335]
Duljina ekvatora: 21 326 km

Masa: 6,418·10^{23} kg [5,976·10^{24}]
Srednja gustoća: 3,94 g/cm^3 [5,51]

Obujam: 16,43·10^{10} km^3 [10,87·10^{11}]
Ubrzanje sile teže: 3,72 m/s^2 = 0,38 g [=9,78 m/s^2]
Brzina oslobađanja: 5,02 km/s = 18 072 km/h [11,18 km/s]

Albedo (vizualni): 0,16 [0,37]
Prividni sjaj: *najveći* -2,9 magnituda, *najmanji* -1,0 magnituda
Prividni kutni polumjer (gledano sa Zemlje): *najveći* 25,16", *najmanji* 3,5"

Temperatura površine (približna):
srednja: -55°C
(najmanja: -170°C, najveća: 20°C)
Sunčeva konstanta (atmosfera):
595 W/m^2 [1380]
Prividni polumjer Sunca: 0,35° [0,53]
Prividni sjaj Sunca: -25,8 mag. [-26,7]
Atmosferski tlak: 699-912 Pa = 7 milibara (1 mb na hrbu Olympus Mons, 9 mb v pánvi Hellas) [101325 Pa]
Brzina vjetra: 2-30+ m/s
Sastav atmosfere: 95% CO_2, 2,6% N_2, 1,6% Ar, 0,13 O_2, 0,07 CO, 0,03 H_2O

GEOGRAFSKI (AREOGRAFSKI) **PODACI:**
Ukupna površina: 144 200 000 km^2
Referentni položaj: trooosni elipsoid
0 m visine: za kartama MOLA (Marsov orbitalni laserski altimetar 1998-99): na polumjeru od 3396 km (areoid). To je približno 1,6 km više nego na drugim kartama (npr. na karti USGS), gdje je 0 m određen razinom atmosferskog tlaka od 6,1 mbar (= trostruka točka vode).
Nulti meridijan (duljina = 00): krater Airy-0
Obujam sjevorne polarne kape:
1,2-1,7 km^3
Obujam južne polarne kape: 2-3 km^3

NAJVIŠE. NAJNIŽE…
(U zagradama visina u km. Izvor: Međunarodna astronomska unija, IAU)
Vertikalna raščlanjenost reljefa: 29,5 km
Najviše točke: *Zapadna polutka:* Olympus Mons (21,3), Pavonius Mons (4), Arsia Mons (9), Ascraeus Mons (~20), Alba Patera (7) *Istočna polutka:* vulkan Elysium Mons (14) *Sjevorno polarno područje:* -1,9 km. *Južno polarno područje:* 4,8 km
Najniže točke: Hellas Basin (-8,2), Valles Marineris (-7)

NAJVEĆE, NAJDULJE…
(U zagradama promjer/duljina u km. Izvor: IAU)
Najdulje doline (vallis): Valles Marineris (3769), Kasei (1780), Ares (1690), Maja (1516), Marte (1185), Simud (1074), Tiu (970), Reull (945), Mamers (945), Ma'adim Vallis (861), Mangala (828), Dao (816), Granicus (750), Hrad (719), Shalbatana (687), Loire (670), Liris (613), Mawrth (575), Al-Qahira (546), Mad (524), Nanedi (508), Nirgal (496).
Najveći krateri: Schiaparelli (471 km), Huygens (470), Cassini (412), Antoniadi (394).
Najveće planine (montes): Tharsis (1840), Nereidium (1677), Phlegra (1310), Libya (1170), Hellespontus (729), Tartarus (830).
Najveći vulkani: Olympus Mons (648), Arsia Mons (475), Ascraeus Mons (460), Elysium Mons (410), Pavonis Mons (375), Hecates Tholus (183), Albor Tholus (170)
Najdulji kanali (fossae): Alba (2077), Claritas (2050), Icaria (2280), Sirenum (2735)

NAZIVI RELJEFNIH OBLIKA:

Albedo feature: Albedoski oblici
Catena, catenae: vulkanski niz
Cavus, cavi: udubine, nepravilne strme depresije obično u nizovima ili skupinama
Chaos: područja područja razlomljenoga terena
Chasma, chasmata: duboke, izdužene, strme depresije
Colles: brežuljci ili izmjena malih udubina i uzvišina (valovit teren)
Crater: kružne ljevkaste depresije
Dorsum, dorsa: hrbat/greben
Fossa, fossae: jarak
Labes, labes: klizište
Labyrinthus, labyrinthi: kompleksi uzajamno prožimajućih dolina
Mensa, mensae: mesa, plato, ravnjak
Mons, montes: planina, vulkan
Patera, paterae: nepravilni krater ili kompleksni krater s nazupčanim rubovima; plitki vulkan
Planitia, planitiae: zavala/bazen
Planum, plana: plato ili zaravan/visoravan
Rupes: eskarpman/strmac
Scopulus: isprekidan, izlomljen strmac
Sulcus, sulci: udoline i hrptovi/grebeni
Terra, terrae: prostrani predjeli
Tholus, tholi: male kupolasta planina (vulkan) ili brdo
Undae: dine
Vallis, valles: doline
Vastitas, vastitates: ravnice

Imena Marsa u različitim jezicima:
arapski: Merrik, *grčki:* Ares, *hebrejski:* Ma'adim, *japanski:* Kasei. *Drugi naziv:* Crveni planet.

CZERWONA PLANETA

OPIS OGÓLNY:
Charakterystyka fizyczno-geograficzna od północy ku południowi:
Północna czapa polarna: Warstwy zamrożonego CO_2, lodu i pyłu pokrywające obszar o średnicy 500 km. Szron CO_2 sublimuje do atmosfery wiosną a zamarza z powrotem jesienią. Czapę otacza niemal ciągły pas piaskowych wydm.
Niziny Północne: rozległe strumienie lawy pokryte osadami; procesy peryglacjalne.
Tharsis i Elysium Montes: wielkie wulkany tarczowe na płaskowyżach wulkanicznych.
Olympus Mons: wysokość: 25 km ponad otaczające równiny; średnica: 600 km, średnica kaldery 65 × 80 km.
Valles Marineris: system kanionów pochodzenia tektonicznego o długości 4000 km; kanały wypływowe.
Wyżyny Południowe: stara powierzchnia silnie pokryta kraterami z dwoma prehistorycznymi basenami uderzeniowymi: Hellas (2000 km średnicy), Argyre (1100 km średnicy). Sieci dolin.
Południowa czapa polarna: Warstwy lodu, zamrożonego CO_2 i pyłu. Wiecej pyłu niż w czapie północnej. Zimy chłodniejsze i dłuższe, zaś lata (peryhelium) cieplejsze i krótsze niż na północy. Warstwy CO_2 nie znikają nawet latem ale powierzchnia lodu kurczy się z zimowych 1800 km średnicy do trwałego letniego obszaru o promieniu 150 km. W regionie polarnym można spotkać pola wydm z sezonowymi, kolistymi, ciemnymi plamami.

MAŁE OBIEKTY:
**Kratery: